

# Scheda 2

**1 Una ortesi è:**

- A Un apparecchio applicato al corpo come correttivo funzionale
- B Un sostituto di parti esterne mancanti del corpo
- C Un sostegno utilizzabile nel cammino su percorsi difficili
- D Un tipo di protesi dentaria specifica per anziani

**2. Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto a queste cause eccetto:**

- A intossicazioni professionali
- B alterazioni visive
- C alterazioni della propriocezione
- D fattori ambientali

**3. Farmaci che contribuiscono al rischio di caduta sono tutti tranne:**

- A farmaci psicotropi
- B ipocolesterolemizzanti
- C diuretici
- D antiaritmici

**4. I germi responsabili di ulcere da pressione infette sono:**

- A cocchi gram-positivi
- B aerobi gram-negativi
- C anaerobi gram negativi
- D tutti

**5. Con l'avanzare dell'età, nel soggetto non cardiopatico la frequenza cardiaca tende a:**

- A rimanere invariata a riposo
- B aumentare a riposo
- C aumentare durante il sonno
- D diminuire sotto sforzo

**6. Quale non rappresenta una complicanza dell'allettamento nell'anziano ?**

- A piaghe da decubito
- B riassorbimento della matrice ossea
- C fecalomi
- D ipocalcemia

**7. Non rallentano il processo di riparazione delle ulcere da pressione:**

- A antibiotici per uso topico
- B soluzioni ipoclorito
- C Sostanze jodate
- D acqua ossigenata

**8. Qual è la più frequente sede di frattura ossea nell'anziano:**

- A estremo prossimale del femore
- B estremo distale del radio
- C estremo distale del femore
- E vertebre

*Rinella Casullo*

**9. Non sono causa di prurito generalizzato nell'anziano:**

- A policitemia vera
- B linfomi
- C Bronchiti Croniche Ostruttive
- D parassitosi intestinale

**10. Non e' una complicanza dell'immobilizzazione:**

- A ipotensione ortostatica
- B Infarto del miocardio
- C trombosi venosa, embolia
- D litiasi vescicale

**11. La frattura di Colles è localizzata a livello di:**

- A estremità distale del radio
- B estremità prossimale del femore
- C piede
- D bacino

**12. La forma di ipertensione arteriosa più caratteristica dell'anziano è:**

- A Ipertensione borderline
- B Ipertensione maligna
- C Ipertensione diastolica
- D Ipertensione sistolica isolata

*R.elli  
Cavella*

**13. Le normali modificazioni cutanee nell'invecchiamento sono:**

A appiattimento della giunzione dermo-epidermica

B aumento del numero di cellule di Langherans

C aumento del numero dei melanociti

D aumento della vascolarizzazione dermica

**14. I siti più frequenti di insorgenza delle ulcere da pressione sono:**

A avambraccio

B coscia

C regione trocanterica

D regione plantare del piede

**15. La capacità funzionale nell'anziano viene valutata mediante :**

A Scala Norton

B UCLA NPI inventory

C MMSE

D ADL e IADL

**16. La scala di valutazione più indicata per la determinazione del rischio di cadute nell'anziano è:**

A Geriatric Depression Scale

B Scala di Tinetti

C Indice di Barthel

D Global Deterioration Scale

*Luigi Caruso*

**17. Quale modificazione si può riscontrare a carico dell'apparato muscoloscheletrico nell'anziano?**

- A osteoporosi
- B osteoartrosi
- C sarcopenia
- D tutte le precedenti

**18. La prevenzione più efficace dell'osteoporosi è:**

- A vitamina D3
- B attività fisica regolare
- C sali di calcio
- D cortisonici

**19. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:**

- A ulcera superficiale
- B eritema persistente alla digito-pressione
- C perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo
- D danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare

**20. Quale tra le seguenti è la complicanza più seria delle ulcere da pressione?**

- A infezione locale
- B sepsi
- C osteomielite
- D artrite



